

## Comparison of concentrations of lipoprotein (a) and serum lipids profile in patients with subclinical hypothyroidism and euthyroidism

Shahebrahimi K<sup>1\*</sup>, Sharifi A<sup>2</sup>, Almasi A<sup>3</sup>, Taliei R<sup>1</sup>, Izadi B<sup>4</sup>, Karimi M<sup>5</sup>

1. Department of Internal Medicine, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2. School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3. Department of Biostatistics, School of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
4. Department of Pathology, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
5. Laboratory Unit, Taleghani Hospital, Kermanshah, Iran

Received: 11.Nov.2012, Accepted: 29.May.2013

### Abstract

**Introduction:** Subclinical hypothyroidism is the compensatory stage before overt hypothyroidism. In overt hypothyroidism, risk of ischemic heart disease increases due to elevation of lipoprotein (a) as atherogenic agent, but evidence for subclinical hypothyroidism is one of the controversial issues in researches. According to the atherogenic lipoprotein (a) and other serum lipids, this study is conducted to compare the serum lipoprotein (a) and other serum lipids in patients with subclinical hypothyroidism and euthyroidism.

**Materials and Methods:** In this descriptive - analytic study 90 persons (60 with subclinical hypothyroidism and 30 euthyroid state) are participated and these referred to Imam Reza and Taleghani Hospitals which are located in Kermanshah. The sampling method is selected with available sampling methods. After differentiating data by age, sex and underlying disease (liver, kidney, drugs), then they were subjected to determination lipoprotein (a) and other serum lipids profile tests.

**Findings:** In both cases and controls, 16/7% were men and 83/3% were women. Based on results, there is no significant difference between serum lipoprotein (a), triglycerides, cholesterol, HDL and LDL in both statistical groups ( $P>0/05$ ). Also there is no association between lipoprotein (a) and other serum lipids ( $P>0/05$ ).

**Conclusion:** Serum levels of lipoprotein (a) and other serum lipids in young patients with normal weight with subclinical hypothyroidism is not increase, thus it can be concluded early treatment is not necessary for them.

**Key words:** Lipids profile, Lipoprotein (a), Subclinical hypothyroidism.

\* Corresponding author,  
Address: Kermanshah, bagh abrisham, Imam Reza Hospital.  
Email: kshahebrahimi@gmail.com

## مقایسه غلظت لیپوپروتئین (a) و چربی‌های سرم در بیماران مبتلا به کم کاری تحت بالینی تیروئید و افراد با عملکرد طبیعی تیروئید

کارون شاه ابراهیمی<sup>1\*</sup>، اعظم شریفی<sup>2</sup>، افشین الماسی<sup>3</sup>، روناک طبعی<sup>4</sup>، بابک ایزدی<sup>5</sup>، محمد کریمی<sup>6</sup>

1. استادیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2. کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3. دانشجوی دکتری آمار زیستی و اپیدمیولوژی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4. پزشک عمومی، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

5. استادیار، گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

6. کارشناس علوم آزمایشگاهی بخش آزمایشگاه، بیمارستان طالقانی، کرمانشاه، ایران

تاریخ دریافت: 91/09/20 تاریخ پذیرش: 92/03/08

### چکیده

**زمینه و هدف:** بیماری کم کاری تیروئید تحت بالینی مرحله جبرانی قبل از کم کاری تیروئیدی آشکار می‌باشد. در کم کاری آشکار به علت افزایش لیپوپروتئین (a) به عنوان یک عامل آتروژنیک، خطر بیماری‌های ایسکمیک قلبی افزایش می‌یابد. ولی در مورد افزایش سطح سرمی آن در بیماران کم کاری تیروئید تحت بالینی بحث و اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به آتروژن بودن لیپوپروتئین (a) و سایر چربی‌های سرم، این پژوهش با هدف مقایسه غلظت لیپوپروتئین (a) و چربی‌های سرم در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی و افراد با عملکرد طبیعی تیروئید انجام شد.

**مواد و روش‌ها:** در این مطالعه تحلیلی مقایسه‌ای، 90 نفر از افراد مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان امام رضا (ع) و طالقانی شهر کرمانشاه (60 نفر مبتلا به کم کاری تیروئیدی تحت بالینی و 30 نفر سالم)، به روش نمونه‌گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد پس از مطابقت از نظر سن، جنس و ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای (بیماری‌های کبدی، کلیوی، مصرف دارو)، تحت آزمایش تعیین سطح سرمی لیپوپروتئین (a) و سایر چربی‌های سرم قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** در هر دو گروه مورد و شاهد، 16/7 درصد را مردان و 83/3 درصد را زنان تشکیل می‌دادند. در این پژوهش، اختلاف آماری معنی داری بین سطح سرمی لیپوپروتئین (a)، تری‌گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین با دانسیته بالا و لیپوپروتئین با دانسیته پایین در دو گروه یافت نشد ( $p > 0/05$ ). همچنین ارتباطی بین لیپوپروتئین (a) و سایر چربی‌های سرم یافت نشد ( $p > 0/05$ ).

**نتیجه‌گیری:** سطح سرمی لیپوپروتئین (a) و سایر چربی‌های سرم در بیماران جوان با وزن طبیعی مبتلا به کم کاری تحت بالینی تیروئید افزایش نیافته و به نظر می‌رسد درمان زود هنگام در این بیماران ضرورتی ندارد.

**واژگان کلیدی:** چربی‌های سرم، لیپوپروتئین (a)، کم کاری تیروئیدی تحت بالینی

\* نویسنده مسئول: کرمانشاه، باغ ابریشم، بیمارستان امام رضا (ع)

Email: kshahebrahimi@gmail.com

## مقدمه

کم کاری تیروئیدی (Hypothyroidism) خود ایمن یک بیماری اندوکرین بوده که در اثر ایجاد پروسه خود ایمنی به تدریج سبب کاهش عملکرد تیروئید می‌شود. در این بیماری یک مرحله جبرانی وجود دارد که طی آن افزایش TSH (Thyrotropin-Stimulating Hormone)، سطح هورمون‌های تیروئید را در حد طبیعی حفظ می‌کند. در این مرحله بیماران علائم و نشانه‌های ناچیزی دارند که کم کاری تیروئیدی تحت بالینی یا ساب کلینیکال نامیده می‌شود و از نظر آزمایشگاهی  $5 < \text{TSH} < 10$  میکروواحد بر میلی‌لیتر و  $\text{T}_3$  (Triiodothyronin) و  $\text{T}_4$  (Thyroxine) طبیعی است. در مراحل بعدی، سطح  $\text{T}_4$  آزاد سقوط کرده و میزان TSH افزایش بیش تری پیدا می‌کند و به بیش از 10 میکروواحد بر میلی‌لیتر می‌رسد. همچنین علائم و نشانه‌های بیماری به سرعت آشکار می‌شوند که به آن کم کاری تیروئیدی بالینی یا آشکار می‌گویند (1). کم کاری تیروئیدی آشکار یکی از فاکتورهای خطر بیماری‌های ایسکمیک قلب و عروق کرونر می‌باشد (2). در کم کاری تیروئیدی تحت بالینی نیز ممکن است اختلالات آتروژنیک لیپیدها مشاهده شود که موجب انسداد عروق کرونر می‌شود (3، 2). بیماری عروق کرونر علت 28 درصد مرگ و میر در سال 1990 و 29 درصد در سال 2001 بوده است و به نظر می‌رسد که در سال 2030، 32/5 درصد مرگ و میر به همین دلیل باشد. طبق آمار، افزایش کلسترول خون سالیانه باعث 56 درصد موارد بیماری ایسکمیک قلب و 18 درصد سکتة مغزی می‌شود (3). همچنین اختلالات پروفایل چربی در همراهی با کم کاری تیروئیدی آشکار و تحت بالینی در بسیاری از مطالعات دیده شده است. مهم‌ترین این اختلالات شامل افزایش کلسترول (Cholesterol)، لیپوپروتئین با دانسیته کم (Low-density lipoprotein-LDL) و تری‌گلیسیرید (Triglycerides-TG) می‌باشد (4-6). مطالعه اتوپسی مبتلایان به کم کاری تیروئیدی آشکار در مقایسه با گروه کنترل، نشان‌دهنده آترواسکلروز پیشرونده شریان‌های کرونر می‌باشد (7).

لیپوپروتئین a (Lipoprotein (a)) یک ماده غنی از کلسترول در پلاسما انسان است که برای اولین بار در سال 1963 مطرح شد. این ماده ترکیبی از ذرات LDL-C است که در آن آپوپروتئین B به لیپوپروتئین a باند شده است (8، 9). این ماده با ایجاد اختلال در جذب شدن پلاسمینوژن توسط گیرنده‌های خود در سطح سلول‌های پوششی عروق و فیبرین مانع از فعال شدن پلاسمینوژن و کاهش تشکیل پلاسمین می‌شود. این عمل موجب رسوب فیبرین در دیواره عروق شده و با افزایش تدریجی رسوب کلسترول روی شبکه فیبرین پلاک آترواسکلروتیک تشکیل می‌شود (10). مطالعات نشان داده است که سطوح بالای لیپوپروتئین a باعث تشدید آترواسکلروز و مهار فیبرینولیز می‌شود. سطح آن بیشتر به فاکتورهای ژنتیکی وابسته بوده و تحت تأثیر غذا و داروهای پایین آورنده چربی خون غیر از نیاسین قرار نمی‌گیرد (11، 12). در سال‌های اخیر لیپوپروتئین a به دلیل اثرات آتروژنیک بالقوه مورد توجه بسیار قرار گرفته است. تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان داده است که ارتباط مستقیمی بین افزایش هم‌زمان مقادیر LP(a) و LDL از یک سو و شیوع بیماری‌های عروق کرونر از سوی دیگر وجود دارد (13، 14). اما طبق مطالعات انجام شده در مورد افزایش سطح LP(a) در کم کاری تیروئیدی تحت بالینی هم‌چنان بحث و اختلاف نظر وجود دارد (2). با توجه به مرگ و میر بیماران مبتلا به بیماری‌های ایسکمیک قلب، خاموش ماندن بیماری تا زمان ایجاد عوارض آن و از طرفی تحمیل هزینه‌های فراوان به بخش بهداشتی درمانی کشور، جلوگیری از عوامل ایجادکننده و خطرناک این بیماری بسیار حائز اهمیت است. همچنین با توجه به فرایند مولکولی پاتوژنز در کم کاری تیروئیدی تحت بالینی، سنجش سطح سرمی LP(a) به عنوان یک عامل آتروژنیک در این بیماران می‌تواند ما را به درمان سریع‌تر و کامل‌تر این بیماری و جلوگیری از عوارض قلبی آن هدایت کرده و از ایجاد خسارات جانی و مالی پیشگیری نماید. بنابراین هدف از انجام این پژوهش مقایسه غلظت LP(a) در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئیدی تحت بالینی و افراد سالم بود تا بر پایه

نتایج حاصل از آن بتوان راهکارهای مقتضی را جهت درمان زود هنگام این بیماران پیشنهاد نمود.

## مواد و روش‌ها

در این پژوهش که با مجوز شماره 6070 کمیته اخلاق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تصویب رسید، طبق روش تحلیلی کنترل‌دار، دو گروه کم کاری تیروئیدی تحت بالینی و سالم (از اول فروردین تا پایان اسفند 1389) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه کم کاری تیروئیدی تحت بالینی از میان افراد مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی غدد بیمارستان امام رضا (ع) و طالقانی شهر کرمانشاه که دارای معیارهای تشخیصی کم کاری تیروئیدی تحت بالینی ( $10 < \text{TSH} < 5$  میکروواحد بر میلی‌لیتر و  $\text{T}_4, \text{T}_3$  طبیعی) بوده و شاخص توده بدنی ( $\text{Body Mass Index-BMI}$ ) آنها در محدوده طبیعی 19-25 کیلوگرم بر مترمربع بود، با در نظر گرفتن معیارهای خروج انتخاب شدند. معیارهای خروج شامل: بیمارانی که در 6 ماه گذشته تحت درمان با لووتیروکسین، گلوکوکورتیکوئید، آسپرین، آمیودارون، داروهای کاهنده چربی خون، قرص‌های جلوگیری از بارداری، آنتاگونیست‌های دوپامین مانند متوکلوپرامید و دومپریدون، مبتلایان به دیابت و خانم‌های باردار بود که از مطالعه حذف شدند. با توجه به نتایج مطالعات قبلی، تعداد نمونه در گروه سالم 30 نفر و در گروه هایپوتیروئیدی تحت بالینی 60 نفر (با نسبت 1 به 2) با اطمینان 95 درصد و توان آزمون 90 درصد تعیین شد (15). پس از تأیید ابتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی در آزمایشات انجام شده در بیماران مشکوک در درمانگاه امام رضا (ع) و طالقانی، پرسش‌نامه‌ای ساختار یافته حاوی اطلاعاتی از قبیل سن، جنس، BMI، تست‌های عملکرد تیروئید و سابقه بیماری‌های زمینه‌ای (از قبیل بیماری‌های ایسکمیک قلبی، بیماری‌های کبدی، کلیوی، مصرف دارو) تکمیل گردید و جهت انجام آزمایشات LP(a) و چربی‌های سرم به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) ارجاع شدند. همچنین در مورد گروه سالم پس از تأیید عملکرد طبیعی تیروئید و

همسان‌سازی از نظر سن، جنس و ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای (بیماری‌های کبدی، کلیوی، مصرف دارو) با گروه هایپوتیروئیدی تحت بالینی، جهت انجام آزمایشات فوق به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) ارجاع شدند. در این مرحله پس از 12-10 ساعت ناشتا بودن سطح سرمی LP(a) (با استفاده از دستگاه هیتاچی 902 و کیت LP(a) شرکت پارس آزمون)، سطح چربی‌های سرم (با استفاده از روش RAαT کیت شرکت پارس آزمون) و سطح  $\text{T}_4, \text{T}_3$  و TSH (به روش الیزا با استفاده از دستگاه استات فکس (State Fax) و کیت شرکت مونوباند (Monobind)) توسط یک تکنسین مورد سنجش قرار گرفت. داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 18 شدند و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های کای دو، تی تست، برابری واریانس‌ها و نرمال بودن داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

## یافته‌ها

در این پژوهش، از 60 بیمار مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی 10 نفر (16/7 درصد) را مردان و 50 نفر (83/3 درصد) را زنان تشکیل می‌دادند و از 30 نفر سالم 5 نفر (16/7 درصد) مرد و 25 نفر (83/3 درصد) زن بودند. دو گروه از نظر جنسیت تفاوت آماری معنی داری با هم نداشتند ( $p=0/74$ ). همچنین اختلاف آماری معنی داری بین BMI و سطح سرمی  $\text{T}_4, \text{T}_3$ ، LP(a)، تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین با دانسیته بالا (High-HDL - density lipoprotein) و LDL بین دو گروه مشاهده نشد. اما سطح سرمی TSH در دو گروه اختلاف آماری معنی داری را نشان داد ( $p=0/001$ ). میانگین LP(a) در کل افراد مورد مطالعه (76/22) 43/99 میلی‌گرم در دسی‌لیتر و در گروه هایپوتیروئیدی تحت بالینی (88/51) 46/88 میلی‌گرم در دسی‌لیتر و در گروه سالم (30/18) 36/97 میلی‌گرم در دسی‌لیتر به دست آمد. قابل ذکر است که برای نرمال شدن داده‌ها، از تبدیل رادیکالی و لگاریتمی بهره گرفته شد و نتایج آزمون t student پس از تبدیل ارایه گردیده

است (جدول 1). هم چنین ارتباطی بین سطح سرمی لیپوپروتئین a با سایر چربی‌های سرم در هر دو گروه مشاهده نشد (جدول 2).

جدول 1. مقایسه میانگین متغیرهای اندازه‌گیری شده در گروه هایپوتیروئیدی تحت بالینی و سالم

p	گروه		متغیر
	سالم n=30	هایپوتیروئیدی تحت بالینی n=60	
	میانگین ± انحراف معیار	میانگین ± انحراف معیار	
0/76	34/63 ± 12/37	34/4 ± 13/07	سن (سال)
0/081	23 ± 1/95	22/08 ± 2/5	BMI (کیلوگرم بر مترمربع)
0/001	2/84 ± 1/08	8/24 ± 0/9	TSH (میکروواحد بر میلی‌لیتر)
0/12	1/27 ± 0/29	1/37 ± 0/24	T3 (نانوگرم بر میلی‌لیتر)
0/37	6/13 ± 0/86	6/23 ± 0/7	T4 (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
0/87	36/97 ± 30/18	46/88 ± 88/51	LP(a) (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
0/63	131/37 ± 72/54	124/55 ± 88/14	تری‌گلیسرید (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
0/92	178/87 ± 43/87	179/86 ± 44/4	کلسترول (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
0/28	108/77 ± 36/79	101/15 ± 30/86	LDL (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
0/39	43/5 ± 12/99	46/05 ± 14/2302	HDL (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)

جدول شماره 2. ارتباط بین LP(a) با سایر چربی‌های سرم در دو گروه هایپوتیروئیدی تحت بالینی و سالم

چربی‌های سرم				میزان همبستگی p	LP(a)	سالم
HDL	LDL	Chol	TG			
0/343	0/012	0/052	-0/188			
0/064	0/948	0/785	0/321			
0/146	0/131	0/137	0/107	میزان همبستگی p	LP(a)	هایپوتیروئیدی تحت بالینی
0/217	0/271	0/248	0/368			

## بحث

پژوهش حاضر می‌باشد. از سوی دیگر، در پژوهش‌های انجام شده توسط لوبوشیزکی در فلسطین اشغالی (20)، گانوتا‌کاز در یونان (21) و کونگ در هنگ کنگ (22)، غلظت LP(a) در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی نسبت به افراد سالم افزایش معنی داری یافته بود که این اختلاف می‌تواند ناشی از بالا بودن میانگین سنی افراد، عدم توجه به BMI آنها و همچنین بررسی زنان میان‌سال و مسن در پژوهش‌های ذکر شده باشد. به طور مثال لوبوشیزکی تنها به بررسی زنان میان‌سالی پرداخته است که BMI آنها بالاتر از 25 کیلوگرم بر مترمربع بوده و در رده

در این پژوهش، افزایش معنی داری در سطح سرمی LP(a) در گروه مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی نسبت به افراد سالم مشاهده دیده نشد (p=0/87). در پژوهش‌های مشابهی که توسط بیهان در ترکیه (16)، لی در کره جنوبی (17)، دانتاس و تازوتزاس در یونان (18، 19) انجام شد، غلظت LP(a) در گروه مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی نسبت به افراد سالم مشابه که از نظر سن و جنس کاملاً مطابقت داشتند، اندکی افزایش داشت، اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود که مشابه یافته‌های

اختلاف در این پژوهش‌ها می‌تواند ناشی از تفاوت در گروه‌های مختلف مورد مطالعه از نظر سنی، جنسی، تغذیه‌ای و ژنتیک باشد. از سوی دیگر در برخی مطالعات مشخص شده است که هایپوتیروئیدی تحت بالینی اتوایمیون نمی‌تواند بر میزان چربی‌های سرم تأثیرگذار باشد و ارتباطی بین LP(a) و سایر چربی‌های سرم در دو گروه هایپوتیروئیدی تحت بالینی و سالم مشاهده نشده است (17، 28، 29) که مشابه یافته‌های این پژوهش می‌باشد. از جمله محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به کم بودن حجم نمونه اشاره نمود و پیشنهاد می‌شود که مطالعات آینده با حجم نمونه بیش تری انجام شود.

### نتیجه‌گیری

به طور کلی با توجه به نتایج این مطالعه، سطح سرمی لیپوپروتئین (a) و سایر چربی‌های سرم در بیماران جوان با وزن طبیعی مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی افزایش نیافته و به نظر می‌رسد درمان زودهنگام در این بیماران ضرورتی ندارد و می‌توان درمان را تا زمان بروز هایپوتیروئیدی آشکار به تعویق انداخته و بیماران را هر سال تحت پیگیری قرار داد.

### تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشکده پزشکی و نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به شماره قرارداد 87101 می‌باشد. بدین وسیله از همکاری تمام عزیزان شرکت‌کننده در طرح و اعضای محترم کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و کارکنان محترم کتابخانه، قدردانی می‌شود.

### منابع

1. Fauci A, Kasper D, Hauser E, Longo D, Jameson L, Loscalzo J. Principles of Harrison's internal medicine (Metabolic & Endocrine). Translated by Sotoudehnia

اضافه وزن قرار داشته‌اند (20). همچنین در مطالعه گائوتاکاز، زنان بالای 60 سال بدون در نظر گرفتن BMI مورد بررسی قرار گرفته‌اند (21).

در پژوهش ما اختلاف معنی داری میان سطح سرمی تری گلیسرید، کلسترول، HDL و LDL در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی و افراد سالم مشاهده نشد اما دانتاس گزارش نمود که در افراد مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی سطح کلسترول طبیعی یا مختصری افزایش داشته است. علاوه بر آن LDL افزایش و HDL کاهش یافته است. همچنین وی اظهار می‌نماید که در مورد عملکرد هورمون‌های تیروئید بر روی غلظت LP(a) هنوز ابهام وجود دارد. به دلیل اینکه در مطالعات مختلف هم افزایش و هم عدم تغییر آن گزارش شده است. این عدم تطابق اغلب به علت پلی مورفیسم ژنتیکی در آپولیپوپروتئین a (Apolipoprotein(a)) و همچنین تفاوت بین گروه‌های مختلف مورد مطالعه می‌باشد (18). کارن و همکاران نیز در مطالعه خود دریافتند که کلسترول، تری گلیسرید و آپوپروتئین‌ها در دو گروه هایپوتیروئیدی تحت بالینی و سالم تفاوتی ندارند ولی میزان HDL در گروه مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی کمتر می‌باشد (23). در بزرگ‌ترین مطالعه مقطعی که توسط کاناریز و همکاران انجام گرفت، مشخص شد که به موازات کاهش عملکرد تیروئید، کلسترول، تری گلیسرید و LDL افزایش یافتند (24). یافته‌های پژوهش منصوریان نیز حاکی از آن بود که میزان کلسترول و LDL در گروه مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی بیشتر از گروه سالم بود ( $p < 0/05$ ) (25). ویرهاپر و همکاران در مطالعه خود بیان کردند که اگرچه کلسترول و LDL در هایپوتیروئیدی آشکار به طور واضح افزایش می‌یابند، اما هیچ تفاوتی بین افراد سالم و موارد تحت بالینی وجود ندارد (26). در مطالعه کانترک نیز مشخص شد که تفاوت معنی‌داری بین سطوح تری گلیسرید، HDL و LDL در دو گروه سالم و هایپوتیروئیدی تحت بالینی وجود ندارد (27) که مؤید یافته‌های پژوهش ما می‌باشد. علت

- turnover. *Atherosclerosis*. 1993;101(1):61-8.
12. Sacks FM, Gerhard M, Walsh BW. Sex hormones, lipoproteins, and vascular reactivity. *Current opinion in lipidology*. 1995;6(3):161-6.
  13. Rifai N, Bachorik PS, Albers JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. *Textbook of clinical chemistry*. 3<sup>rd</sup> ed. Philadelphia: W.B Saunders company; 1999.p. 610-809.
  14. Marcovina SM, Koschinsky ML. Lipoprotein(a): structure, measurement and clinical significance. *Handbook of lipoprotein testing*. Washington: AACC Press; 1997.p.283-308.
  15. Yildirimkaya M, Ozata M, Yilmaz K, Kiliç C, Gündoğan M, Kutluay T. Lipoprotein (a) concentration in subclinical hypothyroidism before and after levothyroxine therapy. *Endocrine journal*. 1996;43(6):731-6.
  16. Beyhan Z, Ertürk K, Uckaya G, Bolu E, Yaman H, Kutlu M. Restoration of euthyroidism does not improve cardiovascular risk factors in patients with subclinical hypothyroidism in the short term. *Journal of endocrinological investigation*. 2006;29(6):505.
  17. Lee W-Y, Suh J-Y, Rhee E-J, Park J-S, Sung K-C, Kim S-W. Plasma CRP, apolipoprotein A-1, apolipoprotein B and Lp (a) levels according to thyroid function status. *Archives of medical research*. 2004;35(6):540-5.
  18. Duntas LH. Thyroid disease and lipids. *Thyroid*. 2002;12(4):287-93.
  19. Tzotzas T, Krassas GE, Konstantinidis T, Bougoulia M. Changes in lipoprotein (a) levels in overt and subclinical hypothyroidism before and during treatment. *Thyroid*. 2000;10(9):803-8.
  20. Luboshitzky R, Herer P. Cardiovascular risk factors in middle-aged women with subclinical hypothyroidism. *Neuroendocrinology Letters*. 2004;25(4):264-8.
  21. Ganotakis ES, Mandalaki K, Tampakaki M, Malliaraki N, Mandalakis AH, Asareh MH. Tehran, Iran. Argmand publication. 2010.p.155-6.
  2. Fatourech V. Is subclinical hypothyroidism a risk factor for coronary artery disease. *Int J Endocrinol Metab*. 2005;2:63-6.
  3. Ichiki T. Thyroid hormone and atherosclerosis. *Vascular pharmacology*. 2010;52(3):151-6.
  4. Pearce EN. Hypothyroidism and dyslipidemia: modern concepts and approaches. *Current cardiology reports*. 2004;6(6):451-6.
  5. Milionis HJ, Efstathiadou Z, Tselepis AD, Bairaktari ET, Tsironis LD, Tsatsoulis A, et al. Lipoprotein (a) levels and apolipoprotein (a) isoform size in patients with subclinical hypothyroidism: effect of treatment with levothyroxine. *Thyroid*. 2003;13(4):365-9.
  6. Caraccio N, Ferrannini E, Monzani F. Lipoprotein profile in subclinical hypothyroidism: response to levothyroxine replacement, a randomized placebo-controlled study. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2002;87(4):1533-8.
  7. Steinberg AD. Myxedema and coronary artery disease-a comparative autopsy study. *Annals of Internal Medicine*. 1968;68(2):338-44.
  8. Berg K. A new serum type system in man-the Lp system. *Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica*. 1963;59(3):369-82.
  9. Zioncheck T, Powell L, Rice G, Eaton D, Lawn R. Interaction of recombinant apolipoprotein (a) and lipoprotein (a) with macrophages. *Journal of Clinical Investigation*. 1991;87(3):767-71.
  10. Marcovina SM, Koschinsky ML. Evaluation of lipoprotein (a) as a prothrombotic factor: progress from bench to bedside. *Current opinion in lipidology*. 2003;14(4):361-6.
  11. Seed M, O'Connor B, Perombelon N, O'Donnell M, Reaveley D, Knight BL. The effect of nicotinic acid and acipimox on lipoprotein (a) concentration and

26. Vierhapper H, Nardi A, Grösser P, Raber W, Gessl A. Low-density lipoprotein cholesterol in subclinical hypothyroidism. *Thyroid*. 2000;10(11):981-4.
27. Canturk Z, Çetinarlan B, Tarkun I, Zafer Canturk N, Özden M. Lipid profile and lipoprotein (a) as a risk factor for cardiovascular disease in women with subclinical hypothyroidism. *Endocrine research*. 2003;29(3):307-16.
28. Efstathiadou Z, Bitsis S, Milionis HJ, Kukuvtis A, Bairaktari ET, Elisaf MS, et al. Lipid profile in subclinical hypothyroidism: is L-thyroxine substitution beneficial? *European Journal of Endocrinology*. 2001;145(6):705-10.
29. Brenta G, Berg G, Arias P, Zago V, Schnitman M, Muzzio ML, et al. Lipoprotein alterations, hepatic lipase activity, and insulin sensitivity in subclinical hypothyroidism: response to L-T4 treatment. *Thyroid*. 2007;17(5):453-60.
- E, Vrentzos G, et al. Subclinical hypothyroidism and lipid abnormalities in older women attending a vascular disease prevention clinic: effect of thyroid replacement therapy. *Angiology*. 2003;54(5):569-76.
22. Kung A, Pang R, Janus E. Elevated serum lipoprotein (a) in subclinical hypothyroidism. *Clinical endocrinology*. 1995;43(4):445-9.
23. Caron P, Calazel C, Parra H, Hoff M, Louvet J. Decreased HDL cholesterol in subclinical hypothyroidism: the effect of L-thyroxine therapy. *Clinical endocrinology*. 1990;33(4):519-23.
24. Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor G, Ridgway EC. The Colorado thyroid disease prevalence study. *Archives of internal medicine*. 2000;160(4):526-34.
25. MansourianAzad R, Ghaemi E, Ahmadi AR. Serum lipid level alternation in subclinical hypothyroid patients in Gorgan (South east of Caspian sea). *Journal of Chinese Clinical Medicine*. 2008, 4(3): 4-5.