

The effect of short time exposure to 4°C temperature on the expression profiles of mono-carboxylic transporter genes 1, 2, 3, and 4 in 4-cell mouse embryos

Ramezani M^{1*}, Hosseini A², Kazemi B³, Janan A⁴

1- Assistant professor, PhD of Developmental Biology, Biology Department, Islamic Azad University of Ashtian, Ashtian, Iran

2- Professor, PhD of Embryology, Anatomy Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3- Assistant professor, PhD of Genetics, Cellular and Molecular Biology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4- MSc of Zoology, Department of Biology, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran

Received 9 Dec 2009 Accepted 20 Jan 2010

Abstract

Background: One way of embryo preservation is cryopreservation, but this process may damage and lead to the loss of the embryos, and bring about chromosomal abnormality. This has led researchers to seek techniques for short term preservation of embryos in 0-10 °C temperatures. The aim of this study was to determine the effect of short time exposure to 4°C temperature on the expression profiles of mono-carboxylic transporter genes 1,2 ,3, and 4(MCT1-4) in 4-cell mouse embryos.

Materials and Methods: In this fundamental study, forty 4-cell mouse embryos from NMRI strain were randomly divided into two groups. The first group consisted of fresh 4-cell embryos, and the second group included 4-cell mouse embryos that were exposed to 4°C temperature for 24 hours. After RT-PCR, the samples were electro-phoresised for expressing the MTC1-4 genes.

Results: The expression of MCT 1-3 was observed in the first group, but the obtained results did not indicate their expression in the second group.

Conclusion: Preservation of 4-cell embryos in 4°C for 24 hours inhibits the expression of MCT 1-3 genes. Keeping embryos in 4°C temperature is not a proper way for their short time preservation.

Keywords: Four-cell embryo, Mice, Mono-carboxylic transporter genes, PCR

*Corresponding author:

Email: mina.ramezani@gmail.com

Address: Biology Department, Islamic Azad University, Ashtian, Iran

اثر کوتاه مدت دمای 4 درجه سانتی گراد بر پروفایل بیان ژن‌های انتقال دهنده مونو کربوکسیلیک 1، 2، 3 و 4 در جنین‌های 4 سلولی موش

دکتر مینا رمانی^{1*}، دکتر احمد حسینی²، دکتر بهرام کاظمی³، ارغوان جانان⁴

1- استادیار، دکترای تخصصی سلولی تکوینی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان، ایران

2- استاد، دکترای تخصصی جنین شناسی، گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3- استادیار، دکترای تخصصی ژنتیک، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 - کارشناسی ارشد علوم جانوری، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت 88/9/28، تاریخ پذیرش 88/10/30

چکیده

زمینه و هدف: یکی از روش‌های نگهداری جنین، انجماد است ولی این فرایند خود می‌تواند سبب از دست رفتن جنین و ایجاد ناهنجاری کروموزومی شود؛ این امر باعث گرایش محققان به تکنیک‌هایی برای حفظ جنین در دمای صفر تا 10 درجه سانتی‌گراد به صورت کوتاه مدت شده است. هدف این پژوهش تعیین اثر کوتاه مدت دمای 4 درجه سانتی‌گراد بر پروفایل بیان ژن‌های انتقال دهنده‌های مونو کربوکسیلیک 1، 2، 3 و 4 در جنین 4 سلولی موش است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش بنیادی تعداد 40 جنین 4 سلولی موش کوچک آزمایشگاهی از نژاد ان ماری به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل جنین‌های 4 سلولی موش به صورت تازه و گروه دوم شامل جنین‌های 4 سلولی موش بودند که به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. پس از RT-PCR و سپس واکنش زنجیره پلی مرز، نمونه‌ها برای بیان ژن‌های فوق الکتروفورز شدند.

یافته‌ها: بیان ژن‌های انتقال دهنده مونو کربوکسیلیک 1، 2 و 3 در گروه اول مشاهده شد ولی در گروه دوم نتایج حاکی از عدم بیان این 4 ژن بود.

نتیجه‌گیری: نگهداری جنین‌های 4 سلولی به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتی‌گراد، سبب عدم بیان ژن‌های انتقال دهنده مونو کربوکسیلیک 1، 2 و 3 می‌شود. نگهداری جنین‌ها در این شرایط روش مفیدی برای نگهداری کوتاه مدت آن نمی‌باشد.

واژگان کلیدی: جنین 4 سلولی، موش، ژن‌های انتقال دهنده مونو کربوکسیلیک، واکنش زنجیره‌ای پلی مرز

*نویسنده مسئول: آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زیست شناسی

Email:mina.ramezani@gmail.com

مقدمه

اسیدهای مونوکرپوکسیلیک نقش مهمی در متابولیسم سلول بازی می کنند زیرا در pH سلولی، اسید لاکتیک تولید شده به آنیون لاکتات تبدیل می شود و این مولکول باردار که با انتشار آزاد قادر به عبور از سلول نیست، به مکانسیم خاصی نیاز دارد که همان وجود انتقال دهنده های مونوکرپوکسیلیک (Monocarboxylic Transporter Genes- MCTs) است که از باکتری تا انسان وجود دارند (1، 2).

این انتقال دهنده ها انتشار تسهیل شده لاکتات را با پروتون کاتالیز می کنند و هیچ انرژی دیگری به جز شیب غلظت لاکتات و پروتون ندارند، به طوری که افزایش pH سلولی انتقال لاکتات را تسریع می کند (3). MCT ها بیشتر لاکتات را انتقال می دهند ولی برای انتقال تعدادی از مونوکرپوکسیلیک های دیگر مانند پیروات، کتون بادی استو استات، بتا هیدروکسی بوتیرات و استات ضروری می باشند، بنابراین نقش مهمی در متابولیسم پستانداران و ارتباط متابولیکی بین سلول ها دارند (4). تا به امروز 14 پروتئین MCT شناخته شده است و از بین آنها فقط MCT1,2,3,4 به خوبی بررسی شده اند (5). این گروه همچنین شامل دو عضو است که اسیدهای آمینه آروماتیک و هورمون های تیروئیدی را انتقال می دهند (6).

MCT1 و MCT4 در بیشتر بافت های بدن بیان می شوند، در حالی که فراوانی MCT2 محدودیت بیشتری دارد (7). MCT1 پروتئینی است با وزن مولکولی 55 کیلو دالتون که 12 قسمت داخل غشایی دارد (8، 9). در عضله اسکلتی، ماهیچه قلب، مغز، شبکه، اسپرما توزوآ، قشر کلیه، معده، کبد، جفت، کولون و روده دیده شده است (10، 11).

MCT2 60 درصد مشابه MCT1 است، دارای تمایل زیادی به مونوکرپوکسیلات ها است و در لوله های پروگزیمال کلیه، نورو ن ها، دم اسپرم و میوسیت های قلبی وجود دارد (12، 13).

MCT3 یک انتقال دهنده مونوکرپوکسیلات متصل به پروتون است و انتقال لاکتات و یون هیدروژن را به

خارج از رتینا تسهیل می نماید، بنابراین می تواند نقش مهمی در هومئوستازی pH در خارج از شبکه داشته باشد (14).

MCT4 یک انتقال دهنده با تمایل کم است که جهت آزاد کردن لاکتات از سلول های گلیکولایتیک مثل عضلات سفید، سلول های سفید خونی و سلول های توموری سازش یافته است (12). این ایزوفرم در قلب و ماهیچه های دستگاه گوارش وجود دارد (15).

MCT ها ممکن است نقش مهمی در تبادل اطلاعات بین سلول ها داشته باشند و قادر به انتقال متابولیت های لاکتات و پیروات باشند و در نتیجه پتانسیل تعادلی سیتوزول را فراهم کنند (16). همچنین MCT ها در تنظیم بیوسنتز هورمون های متفاوت در غده آدرنال پر اهمیت هستند. این ژن ها به عنوان استاندارد داخلی، معرف میزان بیان نسبی سایر ژن ها هستند و به منظور سنجش های کمی بیان ژن ها به کار می روند (17).

یکی از روش های متداول در نگهداری جنین، انجماد است. در دمای پایین متابولیسم سلولی کاهش یافته و تقسیمات سلولی متوقف می شوند به طوری که این سلول ها پس از بازیابی از شرایط فوق و قرار گرفتن در محیط کشت، قادر به ادامه رشد هستند؛ هر چند انجماد می تواند سبب کشته شدن جنین ها و یا ایجاد ناهنجاری های کروموزومی (18)، از هم گسیختگی میکروتوبول ها (19)، اختلال در کلیواژ (20) و اختلال در رشد (21) شود. مطالعات نشان داده که انجماد جنین گونه هایی مانند خوک (22) و یا انجماد جنین در بعضی از مراحل رشد با این روش مشکل است (23).

به دنبال آسیب های وارده شده به جنین در روش های انجمادی و همچنین وقت گیر و پرهزینه بودن آن، توجه عده ای از محققان به روش های غیر انجمادی و نگهداری جنین در دمای صفر تا 10 درجه سانتی گراد برای نگهداری های کوتاه مدت، معطوف شد. نخستین بار روش غیر انجمادی توسط مور و بیلتون در سال 1973 برای نگهداری جنین گوسفند انجام شد (24). گزارش شده که نگهداری کوتاه مدت جنین در دمای پایین به همراه تکنیک های انتقال جنین، می تواند روشی ارزشمند برای

حفظ گونه‌های ژنتیکی، پرورش و تولید مثل حیوانات اهلی، نگهداری گونه‌های کمیاب و در معرض خطر و نیز در درمان ناباروری در انسان باشد (24-26). اما برخی محققان بر این عقیده‌اند که در حین نگهداری جنین در دمای پایین به سبب طولانی شدن زمان نگهداری آن در محیط کشت، میزان رشد و توانایی جنین‌ها در لانه‌گزینی کاهش یافته که این امر ممکن است به دلیل تغییر بیان ژن‌ها باشد (27).

بنابر این در پژوهش حاضر ما به دنبال یافتن تاثیر کوتاه مدت دمای 4 درجه سانتی گراد (که به راحتی توسط نگهداری در یخچال معمولی تامین می‌شود) بر پروفایل بیان ژن‌های MCT1,2,3,4 در جنین‌های 4 سلولی موش هستیم. به عبارت دیگر آیا این دما سبب روشن و یا خاموش شدن ژن‌های مورد نظر در جنین‌های 4 سلولی می‌گردد و یا این که اثر قابل توجهی را در مقایسه با دمای معمولی از خود نشان نمی‌دهد؟

مواد و روش‌ها


جهت این مطالعه بنیادی موش‌های نر و ماده از نژاد ان ماری (NMRI) و با سن بین 6 تا 8 هفته از انستیتو پاستور خریداری شده و در قفس‌های مخصوص نگهداری حیوانات، تحت شرایط کنترل شده از نظر نور، دما و رطوبت در حیوانخانه نگهداری شدند. با استفاده از تایمر اتوماتیک برقی، تناوب نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی فراهم و دمای اتاق در شرایط 21 ± 2 درجه سانتی گراد تنظیم شد. در تمام مدت نگهداری، حیوانات از آب و غذای کافی برخوردار بودند و در کلیه مراحل تحقیق اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی کاملاً رعایت گردید.

جهت تحریک تخمک گذاری، تزریق 10 واحد بین المللی هورمون PMSG (Pregnant Mare's Serum Gonadotropin) و سپس 48 ساعت بعد 10 واحد هورمون HCG (Human Chorionic Gonadotropin) به موش‌های ماده انجام شد و پس از تزریق دوم، موش ماده در قفس موش نر قرار گرفت. وجود پلاک واژینال در روز بعد، شاخص اصلی برای تعیین جفت‌گیری بود. 56-60 ساعت

پس از تزریق دوم، جنین‌ها به مرحله 4 سلولی رسیدند. پس از کشتن موش به روش قطع نخاع، جنین‌ها از اینفاندیولوم اویداکت به طریقه فلاشینگ خارج شدند. جنین‌های به دست آمده در محیط کشت KSOM نگهداری شده و به دو گروه تقسیم گردیدند. گروه اول یا گروه کنترل که شامل 12 جنین 4 سلولی بود که بیان ژن‌های انتقال دهنده‌های مونوکربوکسیلیک 1، 2، 3 و 4 در آنها بررسی شد و گروه دوم یا گروه آزمایش، شامل 12 جنین 4 سلولی که به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد قرار گرفتند تا جهت بررسی بیان ژن‌های فوق مورد آزمایش قرار گیرند. سپس جنین‌ها به لوله‌های اپندرف حاوی بافر نگهدارنده مخصوص کیت استخراج RNA منتقل شدند. در مرحله بعد استخراج RNA توسط کیت RNasy Mini (Qiagen, Germany) صورت گرفت. به این ترتیب که در ابتدا لوله‌های حاوی نمونه (12 جنین 4 سلولی) در دور 10000 و دمای 4 درجه سانتی گراد سانتریفوژ شدند. سپس به محلول رویی بافر تجزیه کننده اضافه شد. پس از گذشت 5 دقیقه و سانتریفوژ مجدد، الکل 70 درجه به آن اضافه کرده و عمل پیتینگ صورت گرفت. سپس محلول واکنش تهیه شده را به ستون کیت اضافه نموده و در دور 10000 و دمای 4 درجه سانتی گراد سانتریفوژ شد. پس از دور ریختن محلول زیری، به میزان 600 میکرولیتر RW1 به ستون اضافه شد و مجدداً سانتریفوژ گردید. در مرحله بعد به همان میزان بافر RW2 به ستون اضافه شد و سانتریفوژ گردید. پس از جدا کردن الکل با اضافه کردن آب به ستون و سانتریفوژ کردن RNA از ستون کنده می‌شود. در ادامه از مخلوط واکنش ساخته شده برای پروسه Reverse (EnzRT, Bafer, Transcription RT) برابر 3 میکرولیتر EnzRT، برابر 3 میکرولیتر dNTP، برابر 30 میکرولیتر Buffer، برابر 15 میکرولیتر RNA، برابر 18 میکرولیتر D.W، برابر 6 میکرولیتر Primer oligi-dt و برابر 1 میکرولیتر Rnase inhibitor به میزان 10 میکرولیتر به هر لوله واکنش اضافه شده و عمل سانتریفوژ تکرار شد. پس از این مرحله لوله

یافته ها

هر سه ژن MCT1، MCT2 و MCT3 در جنین های 4 سلولی موش به صورت تازه (گروه کنترل) بیان شدند ولی ژن MCT4 بیان نگردید (شکل 1).



شکل 1. پروفایل بیان MCT1 در جنین های 4 سلولی موش به صورت تازه روی ژل الکتروفورز. ستون اول: ژن بتا اکتین (243 جفت باز)، ستون های دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم: نمونه های کنترل، ستون سوم: ژن انتقال دهنده مونوکربوکسیلیک 1 (149 جفت باز)، ستون پنجم: ژن انتقال دهنده مونوکربوکسیلیک 3 (199 جفت باز)، ستون هفتم: ژن انتقال دهنده مونوکربوکسیلیک 2 (249 جفت باز) و ستون نهم: ژن انتقال دهنده مونوکربوکسیلیک 4 که بیان نشد.

هیچ کدام از چهار ژن انتقال دهنده مونوکربوکسیلیک 1، 2، 3 و 4 در جنین های 4 سلولی که به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه بوده اند (گروه آزمایش) بیان نگردید (شکل 2). برای نمونه های کنترل منفی از آب بدون DNA و RNA استفاده شد. همچنین برای اطمینان از استخراج RNA بتا اکتین به عنوان کنترل مثبت به کار گرفته شد.



شکل 2. پروفایل بیان ژن های MCT2 در جنین های 4 سلولی در دمای 4 درجه سانتی گراد روی ژل الکتروفورز. ستون اول: ژن بتا اکتین (243 جفت باز)، ستون های دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم: نمونه های کنترل، ستون سوم، پنجم، هفتم و نهم به ترتیب: ژن های انتقال دهنده مونوکربوکسیلیک 1 تا 4 که هیچکدام بیان نشدند.

واکنش به مدت 1 ساعت در دمای 42 درجه سانتی گراد در بن ماری قرار گرفت.

مرحله بعدی شامل روند واکنش زنجیره پلی مرز (Polymerase Chain Reaction- PCR) بود. برای انجام این پروسه ابتدا مخلوط واکنش به ترتیب زیر ساخته شد:

برابر 5 میکرولیتر DNA، برابر 115 میکرولیتر D.W، برابر 3 میکرولیتر dNTP، برابر 6 میکرولیتر Mgcl2، برابر 6 میکرولیتر بافر 18 میکرولیتر، آنزیم 15 میکرولیتر و پرایمر 2 میکرولیتر. سپس به هر لوله مقادیر مورد نیاز مخلوط واکنش همراه با پرایمر اختصاصی اضافه گردید. برای PCR از دستگاه Primus و CORBEIT استفاده شد (جدول 1).

جدول 1. شرایط تنظیم شد دستگاه های Primus و CORBEIT برای انجام عمل PCR

دما	MCT1 C 45 درجه	MCT2,3,4,β-actin: C 57 درجه
دنا توره کردن	94 درجه C	2 دقیقه
*دنا توره کردن	94 درجه C	30 ثانیه
*Annealing	45 درجه C	30 ثانیه
*Extention	72 درجه C	30 ثانیه
Final extention	72 درجه C	5 دقیقه

سیکل PCR، 30 بار تکرار شد (سه مرحله ای که با ستاره مشخص شده است).

جهت الکتروفورز نمونه ها، ژل 3 درصد آگارز تهیه شد و رنگ Sybergreen به همراه نمونه ها در چاهک های ژل ریخته شده و با 83 ولت load شد. سپس ژل در دستگاه UV- Transiluminator قرار گرفت و تصویر آشکار شده برای ارایه نتایج ذخیره گردید.

از آب بدون DNA و RNA به عنوان کنترل و از پرایمر بتا اکتین برای اطمینان از استخراج RNA استفاده شد.

بحث

تحقیقات نشان می‌دهند که سلول‌ها ایزوفرم‌های مختلف MCT را متناسب با نقش فیزیولوژیک خود بیان می‌کنند. ژن‌های MCT در طی تکامل اووسیت و جنین‌های قبل از لانه‌گزینی موش بیان می‌شوند (28).

MCT1 در اکثر بافت‌های بدن به صورت گسترده حضور دارد (9، 10). در مراحل اولیه تکامل قبل از لانه‌گزینی موش، فعال بودن آنزیم لاکتات دهیدروژناز و حضور MCT1 تبدیل لاکتات به پیرووات را تسهیل می‌کند. MCT2 نیز که مشابه MCT1 است در جنین‌های قبل از لانه‌گزینی بیان می‌شود (29) که نتایج این مطالعه نیز بیان آن را تأیید می‌نماید.

MCT3 یک انتقال دهنده مونوکربوکسیلات متصل به پروتون است و انتقال لاکتات را به خارج از شبکه تسهیل می‌کند (10). مطالعات هروبل و همکاران در سال 2002 نشان داد که این ژن در هیچ کدام از اووسیت‌های لقاح یافته و لقاح نیافته و مراحل قبل از لانه‌گزینی جنین موش بیان نمی‌شود (12) ولی مطالعات هاردینگ و همکاران بیان این ژن را در مراحل جنینی قبل از لانه‌گزینی نشان داد که نتایج پژوهش حاضر را تأیید می‌کند (29).

MCT4 یک انتقال دهنده با تمایل کم است که برای آزاد سازی لاکتات در عضلات سفید و گلبول‌های سفید سازش یافته است (12). در این مطالعه مشاهده شد که این انتقال دهنده در هیچ یک از گروه‌ها بیان نشد، بنابراین به نظر می‌رسد که نقش مهمی در انتقال مونوکربوکسیلات‌ها در جنین 4 سلولی موش ندارد. همچنین نتایج سایر مطالعات نشان می‌دهد که MCT4 در جنین‌های مرحله دو سلولی، مورولا و بلاستوسیست نیز بیان نمی‌شود (28) و احتمالاً در جنین موش قبل از جایگزینی عمل نمی‌کند.

در این مطالعه اثر نگهداری کوتاه مدت جنین (24 ساعت) در دمای 4 درجه سانتی گراد بر روی بیان ژن‌های MCT1-3 بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که جنین‌های 4 سلولی موش در حالت تازه این انتقال دهنده را

بیان می‌کنند که تأییدی بر مطالعات انجام شده توسط پول و هالتسرب است (4).

همان‌طور که قبلاً اشاره شد به علت این که روش نگهداری جنین به صورت انجماد می‌تواند سبب ایجاد اختلال در کلیواژ، رشد و از هم گسیختگی میکروتوبول‌ها شود (19-21) عده‌ای از محققین به سمت روش‌های غیر انجمادی برای نگهداری‌های کوتاه مدت روی آوردند که اولین بار توسط مور و بیلتون انجام شد (24).

در آزمایشی که توسط بختیاری و همکاران انجام شد، تأثیر دمای 4 درجه سانتی‌گراد بر روی رشد و لانه‌گزینی جنین 8 سلولی موش مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد نگهداری طولانی جنین‌ها در این دما باعث کاهش رشد و لانه‌گزینی جنین می‌شود و ممکن است تغییر بیان ژن‌ها در این مسئله دخیل باشد اما هیچ‌گونه بررسی ژنتیکی انجام نشد (27).

مطالعه حاضر عدم بیان ژن‌های MCT را جنین 4 سلولی موش پس از نگهداری کوتاه مدت در دمای 4 درجه سانتی‌گراد تأیید کرد.

نتیجه گیری

نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که ژن‌های انتقال دهنده مونوکربوکسیلات 1، 2 و 3 در انتقال مونوکربوکسیلات‌ها از جمله لاکتات و پیرووات نقش مهمی دارند و در مراحل قبل از لانه‌گزینی جنین موش بیان می‌شوند. اما ژن MCT4 در جنین‌های 4 سلولی تازه موش بیان نمی‌گردد.

دمای کوتاه مدت 4 درجه سانتی‌گراد اثر بازدارنده جهت بیان ژن‌های انتقال دهنده مونوکربوکسیلیک 1 تا 4 دارد به طوری که جنین‌های 4 سلولی موش در این دما هیچ‌گونه بیانی برای این ژن‌ها نداشتند؛ بنابراین روش نگهداری کوتاه مدت جنین‌های موش در دمای 4 درجه سانتی‌گراد، به علت اثر بازدارنده‌ای که روی بیان ژن‌های مونوکربوکسیلات دارد برای جنین 4 سلولی موش پیشنهاد نمی‌شود.

MCT4 and facilitates their cell surface expression. *EMBO J*. 2000 Aug;19(15):3896-904.

9. Halestrap A, Meredith D. The SLC16 gene family-from monocarboxylate transporters (MCTs) to aromatic amino acid transporters and beyond. *Pflugers Arch*. 2004 Feb;447(5):619-28.

10. Philp N, Ochrietor J, Rudoy C, Muramatsu T, Linser P. Loss of MCT1, MCT3, and MCT4 expression in the retinal pigment epithelium and neural retina of the 5A11/basigin-null mouse. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2003 Mar;44(3):1305-11.

11. Pinheiro C, Longatto-Filho A, Scapulatempo C, Ferreira L, Martins S, Pellerin L, et al. Increased expression of monocarboxylate transporters 1, 2, and 4 in colorectal carcinomas. *Virchows Arch*. 2008 Feb; 452(2):139-46.

12. Hérubel F, El Mouatassim S, Guérin P, Frydman R, Ménéz Y. Genetic expression of monocarboxylate transporters during human and murine oocyte maturation and early embryonic development. *Zygote*. 2002 May;10(2):175-81.

13. Lin R, Vera J, Chaganti R, Golde D. Human monocarboxylate transporter 2 (MCT2) is a high affinity pyruvate transporter. *J Biol Chem*. 1998 Oct;273(44):28959-65.

14. Zhao C, Wilson M, Schuit F, Halestrap A, Rutter G. Expression and distribution of lactate/monocarboxylate transporter isoforms in pancreatic islets and the exocrine pancreas. *Diabetes*. 2001 Feb;50(2):361-6.

15. Kirat D, Sallam K, Hayashi H, Miyasho T, Kato S. Presence of ten isoforms of monocarboxylate transporter (MCT) family in the bovine adrenal gland. *Mol Cell Endocrinol*. 2009 Jan;298(1-2):89-100.

16. Daniele L, Sauer B, Gallagher S, Pugh EJ, Philp N. Altered visual function in monocarboxylate transporter 3 (Slc16a8) knockout mice. *Am J Physiol Cell Physiol*. 2008 Aug;295(2):C451-7.

17. Wang Y, Tonouchi M, Miskovic D, Hatta H, Bonen A. T3 increases lactate transport and the expression of MCT4, but not MCT1, in rat skeletal muscle. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2003 Sep;285(3): E622-8.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی خانم ارغوان جانان است. بدینوسیله از زحمات ایشان و کارکنان محترم مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی و آناتومی دانشکده پزشکی شهید بهشتی به ویژه آقایان دکتر عابد، دکتر نجات بخش، دکتر گازر، خانم‌ها دکتر بنده پور و دکتر برهانی به دلیل حمایت مالی، تهیه امکانات و هم یاری در انجام این پژوهش قدردانی می‌نمایم.

منابع

1. Dimmer K, Friedrich B, Lang F, Deitmer J, Bröer S. The low-affinity monocarboxylate transporter MCT4 is adapted to the export of lactate in highly glycolytic cells. *Biochem J*. 2000 Aug;350 Pt 1:219-27.
2. Merezhinskaya N, Fishbein W. Monocarboxylate transporters: past, present, and future. *Histol Histopathol*. 2009 Feb; 24(2): 243-64.
3. Halestrap AP, Price NT. The proton-linked monocarboxylate transporter (MCT) family: structure, function and regulation. *Biochem J*. 1999 Oct 15;343 Pt 2:281-99.
4. Poole R, Halestrap A. Transport of lactate and other monocarboxylates across mammalian plasma membranes. *Am J Physiol*. 1993 Apr;264(4 Pt 1):C761-82.
5. Juel C, Halestrap AP. Lactate transport in skeletal muscle - role and regulation of the monocarboxylate transporter. *J Physiol*. 1999 Jun 15;517 (Pt 3):633-42.
6. Galić S, Schneider H, Bröer A, Deitmer J, Bröer S. The loop between helix 4 and helix 5 in the monocarboxylate transporter MCT1 is important for substrate selection and protein stability. *Biochem J*. 2003 Dec;376(Pt 2):413-22.
7. Visser W, Friesema E, Jansen J, Visser T. Thyroid hormone transport by monocarboxylate transporters. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*. 2007 Jun;21(2):223-36.
8. Kirk P, Wilson M, Heddle C, Brown M, Barclay A, Halestrap A. CD147 is tightly associated with lactate transporters MCT1 and

18. Mazur P, Rall W, Leibo S. Kinetics of water loss and the likelihood of intracellular freezing in mouse ova. Influence of the method of calculating the temperature dependence of water permeability. *Cell Biophys.* 1984 Sep; 6(3): 197-213.
19. Trounson A, Kirby C. Problems in the cryopreservation of unfertilized eggs by slow cooling in dimethyl sulfoxide. *Fertil Steril.* 1989 Nov;52(5):778-86.
20. Ruiz de Assín R, Clavero A, Gonzalvo M, Ramírez J, Zamora S, Fernández A, et al. Comparison of methods to determine the assigned value in an external quality control programme for embryo evaluation. *Reprod Biomed Online.* 2009 Dec;19(6):824-9.
21. Ramezani M, Valojerdi M, Parivar K. Effect of three vitrification methods on development of two-cell mouse embryos. *Cryo Letters.* 2005 Mar-Apr;26(2):85-92.
22. Yoshino J, Kojima T, Shimizu M, Tomizuka T. Cryopreservation of porcine blastocysts by vitrification. *Cryobiology.* 1993 Aug; 30(4): 413-22.
23. Check J. Advances in oocyte cryopreservation--part II: rapid cooling using vitrification. *Clin Exp Obstet Gynecol.* 2009; 36(1): 5-9.
24. Moore N, Bilton R. The storage of fertilized sheep ova at 5 degrees C. *Aust J Biol Sci.* 1973 Dec; 26(6):1421-7.
25. Miyoshi I, Ishikawa K, Kasai M, Kasai N. Useful short-range transport of mouse embryos by means of a nonfreezing technique. *Lab Anim Sci.* 1992 Apr;42(2):198-201.
26. Kasai M. Nonfreezing technique for short-term storage of mouse embryos. *J In Vitro Fert Embryo Transf.* 1986 Feb;3(1):10-4.
27. Bakhtiyari M, Sato E, Hosseini A, Sadeghi Y, Karimipour M. The effect of 4 c temperature on development and implantation rate of mouse embryo. *Yakhteh.* 2002;4(15):141-5.
28. Esmailpour T. The expression profile of MCT1, MCT2, MCT3 and MCT4, in mouse embryo. tehran: Shahid Beheshti University; 2006.
29. Harding E, Day M, Gibb C, Johnson M, Cook D. The activity of the H⁺-monocarboxylate cotransporter during pre-implantation development in the mouse. *Pflügers Archiv European Journal of Physiology.* 1999;438(3):397-404.